

УДК 616.33-002-053.5

ДИНАМІКА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ ТА ЗАХВОРЮВАННЯ НА ГАСТРИТ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ярослав ФІЛАК, Золтан ФАБРИ

Ужгородський національний університет

Вивчався вплив комплексного підходу до реабілітації дітей, спостережено позитивні зміни з боку обох патологій. Обстежено 50 дітей шкільного віку, у яких захворювання на гастрит поєднувалося з сутулістю, плоскою спиною, сколіотичною поставою, сколіозом. Під впливом реабілітаційних заходів простежуються позитивні зміни як у клінічних проявах основного захворювання, так і в корекції постави.

Ключові слова: постава, гастрит, фізична реабілітація, масаж, діти, проба Руф'є.

Постановка проблеми. Протягом останніх років спостерігається тенденція до загального погіршення стану здоров'я населення України, насамперед дітей [3]. Вчені пов'язують цю тенденцію зі збільшенням захворювань травного тракту, а також слабкими фізичними навантаженнями. Ю.В. Белоусов, М.Ф. Денисова стверджують, що частота дитячої гастроентерологічної патології коливається в межах 130-180 %, причому відзначається тенденція до збільшення цих показників [2]. Однією з причин відхилення стану здоров'я, зниження темпів фізичного розвитку, виникнення патологічних процесів, що суттєво впливають на фізичну та розумову працездатність, є порушення постави у дітей шкільного віку [10]. Порушення постави і сколіоз особливо часто виникають у період значної активізації процесів росту дітей у віці 10-14 років і мають неухильну тенденцію до збільшення. Прикро, що батьки і дорослі, які оточують дитину, звертаються за допомогою лише тоді, коли добре помітні ознаки відхилень хребта від його фізіологічного положення, проявляються симптоми порушення функцій органів, що з віком може привести до інвалідності [7]. Л.А. Страшок, вивчаючи клінічні особливості гастродуоденальної патології у підлітків, відзначає проблему поєднаності (синтропії) цих захворювань та їх зв'язок з загальними етіологічними факторами, з конституцією включно [8]. Серед симптомів захворювань шлунково-кишкового тракту відзначається напруження м'язів живота, що можуть впливати на стан постави. З іншого боку, неправильна постава, нерівномірне напруження черевних м'язів гіпотетично може стати причиною дискомфорту органів черевної порожнини. Саме тому проблема реабілітації школярів, які мають поєднання порушень постави та захворювання на гастрит, є достатньо важливою.

Вважаємо, що в сучасних умовах проблема порушень постави є актуальною для всіх дітей. Організм дітей і підлітків відрізняється від організму дорослих не тільки розмірами, але й особливостями будови і функціонального стану органів і систем. Процес фізичного розвитку дітей відбувається нерівномірно, періоди посиленого росту змінюються його сповільненням, змінюються енергетичні й обмінні процеси. Відбувається інтенсивне збільшення довжини та маси тіла, кісткової системи [4]. Тому у дітей при неправильному фізичному навантаженні та недбалому ставленні до власної постави можуть виникати стійкі відхилення в розвитку хребта. Статистика підтверджує, що 27 % дітей віком від 7 до 9 років страждають від порушень постави, серед 10-14 річних – понад 40 %. Проблема порушень постави у 15-17-річних підлітків становить 33 %. Сколіоз зустрічається у 15-20 % дітей, причому у дівчат частіше, ніж у хлопців, тому що вони ведуть менш рухливий спосіб життя. Найбільш небезпечним для розвитку порушень постави вважається вік від 10 до 14 років, коли скелет ще не сформувався, а дитині

доводиться частіше сидіти за уроками тощо. Цьому сприяють надлишок ваги, носіння в одній руці важких сумок вагою понад 30 % від ваги власного тіла [4]. Друга велика проблема полягає у тривалому часі, який діти проводять перед екраном комп'ютера. Нормальна ж постава забезпечує оптимальні умови для функціонування всіх органів і систем організму. На позу впливають багато причин: емоції, ступінь розвитку мускулатури і форма хребта.

Метою нашого дослідження було вивчення динаміки співвідношення порушень стану хребта у дітей із захворюванням на гастрит, які проходили лікування на базі санаторію "Поляна".

Методи та організація досліджень. Ми провели спостереження у 50 дітей шкільного віку від 12 до 15 років (середній шкільний вік), з них дівчат – 27, хлопців – 23, які перебували на санаторно-курортному лікуванні в санаторії "Поляна" терміном 24 дні. Для спостереження із направлених на оздоровлення в санаторій учнів була відібрана група з 50 дітей, у яких захворювання на гастрит поєднувалося з порушеннями постави. Діагноз гастрит базувався на даних клініко-лабораторних та інструментальних методів дослідження, які проводились за місцем проживання.

Для визначення порушення постави всім дітям, які розпочинали курс реабілітації, проводили 5 тестів: тест біля вертикальної площини, біля дзеркала на симетричність постави, тест на розташування остистих відростків на одній вертикальній лінії, тест на рівність трикутників талії, тест на симетрію кутів обох лопаток, тест на виявлення функціонального блоку прямих м'язів спини при нахилі хребта. Ступінь кіфотичної постави визначався розрахунком плечового індексу, де ширина плечей вимірювалася сантиметровою стрічкою між плечовими точками спереду, а плечова дуга між точками ззаду і перемножувалася на 100 %. Зміни у сполучній тканині визначали методом пальпації 2 і 3 пальцями зі зміщенням шкіри на спині, а також методом відтягування шкірної складки і прилеглої до неї шкірної клітковини. Для оцінки стану здоров'я та фізичної працездатності дітей використовувались функціональна проба Руф'є. Цей показник розраховується на співвідношеннях величини пульсу, зафіксованої на різних етапах відновлення після відносно невеликих навантажень. З цією метою діти виконували 30 присідань за 45 секунд. Пульс визначався в положенні лежачи на спині протягом 5 хвилин за 15 секунд до навантаження, а потім знову підраховувався за перші 15 секунд і останні 15 секунд протягом першої хвилини в період відновлення. Одержані результати розраховувалися за формулою. Ця проба є достатньо інформативною і не потребує додаткового обладнання.

Результати обстеження та їх обговорення. У обстежених дітей виявлено порушення постави у сагітальній і фронтальній площині. У результаті проведених обстежень порушення постави виявлено у 100 % хворих на гастродуоденіт, тобто у 50 дітей. Із них сутулість (збільшення грудного кіфозу і зменшення поперекового лордозу) виявлено у 21 школяра – 42,0 %, сколіоз (боковий вигин хребта) – у 5, тобто у 10 %, плоска спина (зменшення фізіологічних викривлень хребта) – у 9 дітей – 18 %, сколіотична (асиметрична) постава – у 15 учнів – 30 %. При пальпації методом натискування і зміщення досліджуваної ділянки виявлена болючість шкіри справа від хребта у ділянці спинномозкових сегментів D6-D9. Усі діти, які направлялися в санаторій з діагнозом гастрит, на початку лікування скаржились на втомлюваність, болі в ділянці шлунка, печію, нудоту, здуття живота тощо.

Перед початком реабілітаційного курсу проведено пробу Руф'є, у хворих на гастрит високий індекс працездатності не був виявлений, натомість середній показник за цим тестом становить $7,7 \pm 0,4$ балів, що відповідає задовільній оцінці. Найнижчі показники (погано) виявлені у 9 дітей. Дані щодо цього тесту на початку і в кінці курсу наведені у таблиці.

Всі пацієнти пройшли курс відновного санаторно-курортного лікування, який включав щадно-тренуючий режим, прийом (внутрішньо) мінеральної води Поляна Купіль,

вуглекислі мінеральні ванни, лікувальну гімнастику, сегментарно-рефлекторний масаж. В комплекс лікувальної гімнастики входили спеціальні вправи, які були направлені на корекцію порушень постави та покращення функцій шлунка і пілородуоденального відділу крово- і лімфообігу в органах черевної порожнини, зміцнення м'язів живота з підвищенням внутрічеревного тиску у поєднанні з дихальними вправами і вправами розслаблення. Проводили сегментарно-рефлекторний масаж спини, зокрема нижньогрудинних і поперекових спинномозкових сегментів, що дало можливість впливати на стан шлунка та пілородуоденальної зони, покращення функцій ЦНС, нормалізацію секреторної і моторної діяльності шлунка, регенеративних процесів. Призначення лікувальної ходьби, теренкуру, кліматотерапії – це адаптація до психологічних і фізичних навантажень, а також відновлення працездатності. Комплекс фізичної реабілітації був спрямований на відновлення порушених механізмів адаптивної регуляції і саморегуляції на різних рівнях.

Таблиця 1

Результати проби Руф'є

Порушення постави	К-ть	Результати проби Руф'є							
		До реабілітації				Після реабілітації			
		добре	середн.	задовіл.	низький	добре	середн.	задовіл.	низький
Сутулість	21	2	6	9	4	5	9	6	1
Плоска спина	9	1	2	5	1	2	4	2	1
Сколіотична постава	15	1	3	7	5	3	5	5	2
Сколіоз	5	-	1	2	2	-	2	2	1
Разом	50	4	13	22	11	10	20	15	5

Контрольну групу становили 15 дітей такого ж віку, у яких порушення постави поєднувалося з захворюванням на гастрит, для них у комплекс лікувальної гімнастики входили загально-розвиваючі вправи і класичний масаж.

В результаті проведеного курсу реабілітації всіх дітей, у яких виявлене порушення постави у поєднанні з захворюванням на гастрит, було повторно обстежено, зафіксовано покращання показників як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру. Зокрема, повторно виконана проба Руф'є показала загальне підвищення індексу працездатності до рівня добре, дистрибуція порушень постави змінилася: прояви сутулості зменшилися до 18% (у 12 школярів), сколіозу – 6% (у 2 школярів), плоскої спини – 8% (у 5 школярів), сколіотичної постави – 14% (у 8 дітей). Разом з тим зникли скарги на болі в ділянці епігастрію, помірно здуття живота, нудота у 89,5% пацієнтів. Кращі показники виявлялися у експериментальній групі, порівняно з контрольною.

Висновки

1. Підсумовуючи результати спостережень за школярами, які пройшли курс поєднаної реабілітації, спрямованої на основне захворювання та порушення постави, можемо констатувати, що названі патології є часто поєднаними і взаємно посилюються, погіршуючи тим самим загальний фізичний стан пацієнта.

2. Виходячи з таблиці, зниження працездатності більш виявлене у дітей, у яких захворювання на гастрит поєднувалося з сколіотичною (асиметричною) поставою, сутулістю та сколіозом.

3. Застосування комплексу спеціальних вправ та масажу, які цілеспрямовано направлені на усунення поєднаної патології, є ефективним засобом реабілітації постави та, одночасно, посилює вплив курортних факторів на функцію шлунка.

4. Санаторно-курортна реабілітація дітей, у яких порушення постави поєднується з захворюванням на гастрит, є доцільною та достатньо дієвою.

Список літератури

1. *Апанасенко Г.Л.* Эволюция биоэнергетики и здоровья человека. – Санкт-Петербург, МГП «Петрополис», 1992. – 123 с.
2. *Белоусов Ю.В., Денисова М.Ф.* Гастроэнтерология – актуальна загальнопедіатрична проблема // Современная педиатрия. – № 3 (12). – 2006. – С. 121-122
3. *Воскобойникова Г.Л., Жульова С.І., Воскобойников О.В.* Методичні підходи до організації оздоровчої профілактичної роботи в загальноосвітній школі // http://www.bdpu.org/scientific_published/pedagogscs_4_2006/9.doc.
4. *Котешева И.А.* Нарушения осанки. Лечение и профилактика. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 208 с.
5. *Круцевич Т.Ю., Воробьев М.И.* Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей. – Киев, 2005. – 195 с.
6. *Милюкова И.В., Евдокимова Т.А.* Лечебная гимнастика при нарушениях осанки у детей. – М.: Изд-во Эксмо; Спб.: Сова, 2003. – 128 с.
7. Профілактор Євмінова як засіб корекції порушень постави у школярів / П.Д.Плахтій, В.М.Мухін, В.В.Євмінов, І.О.Куделя. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2006. – 160 с.
8. *Страшок Л.А.* Клинические особенности гастродуоденальной патологии у детей подросткового возраста // Современная Педиатрия. – № 4 (13). – 2006. – С. 96-133
9. *Фогель Х.-Х.* Онтогенез, физиология и патология позвоночника. – М., 2000. – С. 4-5
10. *Язловецкий В.С.* Физическое воспитание подростков с ослабленным здоровьем. – К.: Здоров'я, 1987. – 136 с.

ДИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ГАСТРИТОМ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ярослав ФИЛАК, Золтан ФАБРИ

Ужгородский национальный университет

Аннотация. Изучалось влияние комплексного подхода к реабилитации детей, наблюдались положительные изменения со стороны обеих патологий. Обследовано 50 детей школьного возраста, у которых заболевание гастритом сочеталось с сутулостью, плоской спиной, сколиотической осанкой, сколиозом. Под влиянием реабилитационных мероприятий прослеживаются положительные изменения, как в клинических проявлениях основного заболевания, так и в коррекции осанки.

Ключевые слова: осанка, гастрит, физическая реабилитация, массаж, дети, проба Руфье.

DYNAMICS OF CORRELATION OF BEARING DYSFUNCTIONS AND GASTRITIS DISEASE AMONG THE SCHOOLCHILDREN

Jaroslav FILAK, Zoltan FABRI

Uzhhorod National University

Abstract. The impact of the complex approach to the rehabilitation of children is studied. The positive changes from the side of both pathologies are observed. 50 children have been the object of investigation, who have gastritis diseases combined with a stoop, flat back, scoliosis carriage, scoliosis. Under the influence of rehabilitation means positive changes are observed both in clinical displays of the main disease and in the correction of carriage.

Key words: carriage, gastritis, physical rehabilitation, massage, children, Ruffe's test.